

木本花卉

夏插快繁技术



在高温高湿的条件下，夏插花卉枝条的分生组织——形成层活动旺盛，易于愈合生根，能大大缩短插穗生根的时间，提高扦插成活率，并能节省人力、物力，值得采用。其技术要点是：

一、插床要求。插床应选择通风、背阴良好、避开西照的地块。土壤必须清洁、无病虫害感染，基质土壤类可根据扦插花卉种类的不同择优选用。如山茶、桂花、含笑、月季、天女花、紫玉兰等以黄心土为理想；黄杨、金边女贞、木槿、爬墙虎、夹竹桃、扶芳藤等，则以砂壤土为好；梔子、小叶梔子以紫砂扦插为上；扶桑、灯笼花、琼花、叶子花则以腐殖土为宜。插床要中间稍高，四周略低，以防积水。

二、扦插方法。5月下旬至7月中旬均可进行夏插。桂花、山茶、扶桑、绣球等，以半木质化程度稍强的枝条扦插最易生根，夏插时间宜早些。黄杨、法国冬青、金边女贞、紫玉兰、含笑、月季、橡皮树、梔子、扶芳藤等，以全木质化的枝条扦插容易生根，夏插时间应稍迟。插穗以发育充实、健壮、具芽、无病虫害的树冠中上部枝条为好。插穗上的多余叶片尽量剪

去，以减少叶面水分蒸发。桂花、山茶、扶桑、梔子、含笑可留2片叶子；黄杨、金边女贞、扶芳藤、金钟、迎春、六月雪、夹竹桃、小叶梔子等，可多留几片叶子；橡皮树、紫玉兰等，只留半个叶片；月季、爬墙虎、天女花、龟背竹等，可不留叶片。插穗插入基质的深度约为穗长（10~15厘米）的1/2或2/3。山茶、桂花、含笑、天女花等，在扦插后浇一次透水，插床两侧架以竹弓，覆盖塑料薄膜保湿，再加双层荫棚，则可明显提高扦插成活率和缩短生根时间，但大部分种类只需要在扦插完毕后，浇足水，搭一层荫棚即可。此外，扦插时还必须随采条，随剪穗，随扦插，随浇水，随遮荫，以减少插穗自身水分的损失。

三、插后管理。主要是控制湿度和光照。经常进行叶面喷水和扦插床灌水，保持床面湿润，降低床面温度，为插穗创造良好的生根条件。插穗生根后，适当减少浇水，加施适量的稀薄液态肥，以加速扦插苗生长。秋季注意防旱，冬季适当防寒，翌春即可分栽。

（□224500 江苏滨海县坎南农干校苗圃场 谢刚 元利）

秋季扦插，注意随天气变化，及时转移到室内向阳处或窖内。珍贵品种可扦插腋芽，用土可少一些，叶的1/2露

在土外。

（□162131 黑龙江甘南县中兴乡永久村前屯 付修忠）

